
)南米ペリュノ古柯



林學博士

きいろすっぽんたけ (新稱) (Ithyphallus costatus Penz.)

ノ後川

村君ハ此

蕈

ヲ精

澤デ

極 ナ

コ テ多

7 イ 尤モ

ノ蕈 脱色

於スニ

テル限シ

混亂ヲ引起

標本デ 觀察記1

後日之ヲ

生

色

ンタ箋デ

Æ

添

Ithyphallus costatus

デア

中ル

/」ニ加ヘランベニー種確實に

員ニ日本ノ「フベタ夫レデ本屬

各地 其產地

標本ヲ

ダ

更

擴 調

地

モ

產

N

コ

ガ゛

金

亮

昭

和

年

Ė

月カラ二月

デ南米

秘",

露ュ

行 ダ 同

地

デ

古二

柯カ

地

時

見

タ 培

ŀ ヲ

ヲ

次

=

小 ヌ

シ

力

書

イ

デ

見 =

ⅎ

ペリュニ於ケル古柯ノ樹 (Erythroxylon Coca I.AM.)

柯 秘 2山露 ア デ 後裔はアル神 嚙 , リス 「イ 、 聖 2 樹 ŀ ラーチ テ 貴 力 ラ 重 ク柔軟 = ス N ヲ 4 所謂 嚙 云 r ム フ、 = Divine plant ト吾人ノ煙草 日本ノ「一ぷく」ト等 · ヲ 吸 デ ッ フ 葉 如 2 ヺ 叉 馬 ス jν ŀ 雨 ガ y 降 實 N ŀ ヲ ŀ サ ス ム 言 N ŀ 小 同 ハ サ v デ ナ 皮

古 土

瓜 哇

葉

ガ

生

シ黄緑色

一デ薄

デ

枝

生

ス

n

傾

向

ガ

7

反之

粗 granatense 未 古 デ 形 N ヲ テ ダ = 柯 葉 態 異 居 見 、 大 ŀ 付 ガ ガ 力 \mathcal{T} 牛 哇 出 HIERN. 前者 瓜哇古 ŀ ラ イ 稱ス、 產 來 ク 現 ヌ ナ 密 ナ 1 尤 1 生 柯 モ 瓜 Æ ガ 後者ハ Erythroxylon sp.) Erythroxylon シ 瓜哇種ハ ŀ 近 ~! 原 哇 ナ ŀ ペ IJ 產 ŀ イ IJ y 全 ~! 地 ٦, 到 リ ガ 叉厚 違 n ペ‖ ٦, リュ フ、 古 柯 處 IJ ŀ 味 柯 = ク 生 ۲ ٦. ガ novo-枝 自 ガ 力 デ 重 ソ 形 生 7 ク

園

ケ

年

ヲ

通

ジ

天

氣

デ

7

限

y

毎

H

採集

ガ

出

來

n

樣

區

劃

ガ

出

テ居

摘

ン

K

葉

ハ土名「ビ

フ

取

年 後

間

ラ

嚙 出 ッ ķ 鞄 粉 **≥**⁄ テ 末 テ ヲ Ź ヲ 口 肩 着 力 = V ラ ヶ ス テ 置 掛 テ V 之ヲ 數 ク + 7 ソ 同 Ħ 本 鞄 , 嚙 球 嚼 Y 中 ガ 煙 中 ゔ 球 管 揷 ヲ ィ 腰 形 A 込 古 ₹ = 丸 サ 柯 ヲ メ ス 葉 絕 n ヺ ŀ 工 入 ズ 次 同 ギ ジ L Æ デ 叉 グ = ソ 瓢 7 鳣 n サ ŀ 栓 セ = 所 jν 先 ヲ デ 嚙 * r = Z ン 附 jν = ク イ ハ ヮブ 若 鞄 テ v 居 イ 力 ラニ、 婦 ŀ n 小 云 人 フ サ 三枚 嚙 ナ 小 サ ヌ 1 樣 古 瀌 ガ [柯葉 老 ナ 棒 ヲ 石 石 取 灰 往 ヲ 灰 ŋ


デ

居

タ

號五第卷四第誌雜究研物植 栽 地 Ŧī. 古 イ 支流 培 慗 百 柯 番 3 ۱ر ŋ 的 ア ス 圸 拁 古 ŀ 柯 ワ n 7 ~:1 ヲ = 茶 有 藥 市 海 葉 ャ 人 リ Æ ₹/ ~ 名 그 デ 良 タ P ガ 口 力 鐵 ラ Ш ガ 畑 珈 ッ ダ 社 道 7 7 æ 琲 ガ ガ 7 藥草 大 n 畦 ソ 流 餘 $\boldsymbol{\mathcal{Y}}$ ン 力 ŀ 部 デ ダ 間 ラ 同 IJ 3 デ 栽 , IJ ス 施 ケ 匹 分 園 テ ス 培 居 Щ 肥 ヲ 呎 7 デ 小 ヲ 毛 テ 東 觐 尺 地 ソ サ Ŀ 系 ヲ iv 本 藥 區 ス ワル 株 方 1 ボ 間 間 域 磋 的 ヌ 町 IJ 頂 越 n デ 供 ッ デ コ = 工 消費 呎 溪谷 デ 更 ŀ ス 餘 7 ガ タ ラ 1 町 ガ 植 n パ n V 7 IJ 殆 ラ 栽 方 ン = 廣 = 力 7 當 自 隧 後 形 日 ラ IJ ゾ コ パ n 道 當 **ŀ**" = 力 ラ ャ ワル マ| ナ ŋ ラ 年 四 車 無 IJ 1 4 力 イ 標 角 Ħ ン ŀ ガ ラ デ 源 ィ 目 V 百 # 高 ナ キ Ш 頭 力 n 云 ラ 穴 傾 フ # Ŧi. = = 西 多 所 萬 近 葉 里 ゙ヺ Ŧi. 沿 里 至 集 掘 地 小 ヲ Ŧi. イ ラ 產 嚙 ア 千八 兀 = 1 山 ワ ガ ij ガ テ 地 四 道 滴 Щ Ж Ħ × w 下 ヌ = 月 來 ワ 奥 百 角 ヲ = n 3 下 呎 目 市 N ヌ = = ッ 隅 • 種 附 毎 デ = ナ w ŀ テ カラ 高 + ., ŀ ヲ 沂 古 微 新 サ ナ テ ス ガ 數 柯 居 # 芽 五、二 本 妙 * ソ 月 ス 里 ダ 宛 力 ナ Ŧi. セ 1 n N 性 ラ 里 ケ 都 味 17 _ 灾 質 附 ヲ 合 黎 ガ 110 = ŀ 散 デ 殘 = 近 兀 \mathcal{F} 力 车 ガ 地 仕 大 y ガ 町 本 ŋ 出 デ シ パ 立 ナ テ成 딞 古 7 r ヲ 四 = 來 ス ラ老木 植 v 柯 沿 質 コ 月 葉 關 栽 = フ = 培 海 ヲ テ n 至 3 秘 海 7 係 露 ア 拔 IJ ガ 拔 ヌ 中 活 雨 同 7 7 コ 着 古 心 千 萬 摘 期 ゾ デ 呎 几 デ 力 柯 ン 至

米



古柯葉ヲ羊毛ノ袋ニ入レテ石ニテタヽキ 騾馬ニ馩ミ易キ様ニスルトコロ (ペリュ)

古 モ ラ取 上 原 [柯葉 隊 ッ 一袋ハ五「ア鰺=當ル)デア ŀ 葉色ガ青イノデー番 料 ヲ Æ イ y シカラー 編成シ先頭 7 變色 フ ス 五ア = ガ工場: メ ト云フ、 ナイ 變ジ タ後、 ₹/ ナ 粗 タ ノク・ П 價 ガ少 ダ ス Æ 格 仕 ナ 馬 騾 ナ 古柯葉ヲ運搬 味ノョ ガ安ク 馬 Ŀ 時 天 屑葉 高 y Ż モ イ 至 古柯葉 氣 値 駄 N ナ 段 = ヲ デ , ヲ 掃 搔 Ŧī. v 多 Æ 3 ŀ ワ ッ ワ 高 持 製造 ハ之ヲ 1 キ キ ス ケ ガ イ ŀ ヌ ヌ 出 ソ 時 混 r イ 時 3 古 ワ ワ シ = J 乾 セッ = セ 市 所 柯 ヌ テ 四等 力 テ = 羊毛製 家 ŋ セ 粗 頭 デ 、コトモアッタ、 最高二十五「ソ 雨天 吅 運 製 デ 乃 足 = 分 葉 時 + 運 デ 中 ブ、粗製 間 附屬 ブ ャ ケ = 1 カイ 青色 位 ガ 數 四 3 ₹ デ 頭 ッ ガ ヲ 塵 葉 品 モ

滿 Ŧi, 士 ス 通 n ゥ シ 才 十二一アロ 澱 n 叉 硫 , ッ 石油 液 デ ス ァ n ヲ 他/「ア 內 少量 掬 グ更 E 造 = バ 取 ラ 入 デ高 ヲ ス jν 沈 y = 加 v w 力 叉別 最 葉 澱 順 1 y 物 後 時 力 = 次第三、 ラ ラ桶 高 ハ 樽 四 純 加 上 サ 三入移 白色デ = キ 石油 石 呎 п v グ 布 ノ樽 ル、コ ラ硫酸 重リ 徑六 ヲ入レ攪拌 ラ デ濾過壓搾 ム」ノ「コ n ラ置 呎 ノ液 <u>_</u> 移 ラ加 計 ス 達 7 ÿ にニーソ ŀ スル ヘル **≥**⁄ 1 力 ソノ液ガ次第ニ濃ク 木 Þ v 一晝夜ノ後樽 イ テ乾燥 1 製 ŀ ン ダ」ヲ 硫酸 し ガ = 樽 カイン」ハ 取 ラニ、 <u>پ</u> 中 = V 性 力 = ル ノ下部 1 カ 刀口 ナ ン イ 石油 粗 個 _|ガ石油カラ分離スル、 ナ ン ニア 製 ヲ 'n, ケ ~ Ξ 備 デ加 コカ ì 溶解シテ ıν キ 7 栓 第 イン」一「キ _ヲ製リ , ヲ ルト 液 ヌ 7 水ニ 石 ŀ = ク樽 浮ブ、 油 褐色ノ 力 u 鑵 柯 ィ グ = 葉 ン コ ラ 水ガ , 詰 ヲ ム ノミ 入 硫酸 メ ラ炭酸 し_て 力 出 リ V ィ 相 ガ 水 ン」ヲ含 桶 場 = ヲ ッ 此 力 1 百 底 ィ 1 杯

前 古 者 柯 ハ星古柯園 ハ土名 「Atta cephalotes (L.) ナルコトガ分ッタ)ナド ノ!フテ枝=上ガリ薬ヲカミ切り地中ノ巢ニ轍)ナド ノ ガ餘リナ ガ ニータ ハ適地 一滯在中 1 = クしョ サ ナー ヘア 經 営サ y = ト云フ、 ノ附近ノ植 æ 輕 ヘヨク ٠Ŋ٩ 栽培 1 ・ノデ名 バ損失 ガ極 葉ガやつで 物 ガ メテ容易 採集 ヲ 知 招 ラ 害蟲 グラ試 レ ク タ 如 = デアル ŀ Ę ガ 裏面白毛デ徑 相 ガ殆 ダ 當被 ١ サ 特 F* ソ 害 , = 無 Balsa消 リアナ 珍ラ イ尤 費 モ シ ス , 一尺內外ノ (四語ノ筏ノ意、丸木ヲ組ミ筏ヲ製スルニ) 大部 イノ ガ 7 U ハ蟻植物ト 分 ン ガ ギ 困 土 ァ 難デナ 人 |(対異が 幹ノ髓 消費 ٠ テ有名 ス葉 = 當 二人太 ŀ テ テ カ ラ Cecropia ゥ V デア ・テ空洞 タ n カ」(種ニテ , ッ デ 相 種

" タ 樹 = 1 種 隔 F 名 大學 1 壁 ナ ガ ホ グ 不 7 崩 n V ì デ コ Cecropia 葉館 中 = 蟻 peltata ガ 棲息 スト ン ŗ ス jν デ 1 研究 デ ナ イラ n ¥ 余ノ シ y 1 peruviana Johnston n ୬ サ タ蟻ハ 屬 名ヲ Camponotus Ochroma ŀ 命 名セラ ŀ ナ 云 フ N = ŀ ガ分

ì

,

n

クシ

ガ

7

米 ペリュノ古柯

n

思

フ

加 一種 菊 家 科 ン 植 科 ガ デ Æ नि 物 植 地 周 ス チリ 物 面 圍 ガ Ш 甚 多 系 = = 7 ダ ŋ ŋ ハ 名果 グッ着 多 叉 西 n (野牡 樣 側 ŋ /羊齒 デアル ィ チ 戸科 テ咲 雨 т, 屯 ガ ŋ 余ノ採集品 相當 办 :ラ種 イテ居タ モ イ ャ 類ガ ニア デ ア ッ 植 番目 物 Þ rボ ン カ デス F 半 **荳科植物** = さぼてん 着 二,前 7 ガ ノ東側ニ出 記 Þ ア 、實竹ノ様ナ空洞 ッ 類、 ハ少イ様デアッ 沙 ヌ 龍舌蘭 アンデス山 Ħ n ン ス ŀ 植物帶 ナ ŀ į, ン 上海拔 B. 君 ガ ガー 多 = ナイ蔓性ノ竹モ珍ラシ ク叉原 渡 コ ノ附近 變シ密林 シ 萬五 ß カラ不日研究ノ 千呎 ノ植物 = ŀ ハ 內外 ナッ 特 ハ調査 有 タ、 地 有刺 クコノ他蘭科 結果 ガ未ダ不完全 喬木叉ハ ハ草原デ 森林 ガ發表 ガ 灌 菊 7 朴、五、佐、 科 IJ ナ

1: Ш 村 淸

ŀ

シ

學博

地産 子等 昭和 題 ceae-昨 ガ ノ 此 虎斑 圖 Ŀ 私 子囊胞子 セ 车 年 ` ラ [ヲ示 中 ガ 竹菌 ŀ + 月 曾 兩 ス 方ノ =テ **≥** フ 月下 十一日發 理科大學紀要第二十三卷第二號 ガ八房ヲ有シ褐色ヲ呈ス テ之ヲ説明シ分類上 單房デ Miyoshia fusispora 工 標本ョ丁 IJ 旬 7 ,ナクテ數個 行 臺灣屛東在 Ceratosphaeria 寧ニ比較シテ異同ヲ決定スル必要ガアラウ ŀ 銷 乜 jν ノ位 本 住 KAWAM. 隔壁ヲ持ツモ **上誌第四** r 屬 置 Щ モ = 口 ŀ 卷第 屬 氏 , **≥** デ テ 力 1 ス 載 記載 n ラ 7 ハ , 菌 球果菌 送 號 セ v ガ ラ = Þ ŀ = アル 虎斑 照 朝 比 v 種デ ø 比奈君ガ蕾軒 シ合フト兩者非常ニ 類 **≥**⁄ カラ 竹 內 菌 地 アラウト述べ = Sphaeriales 其點 附 就 產 圖 1 テ 中 其 æ ŀ ŀ, 獨語 云っ意 , 全形、 ゥ 八胞 胞 1 デアラ 子 其 セ 酷 字 更 十二 被子器、 味 ラ 發芽 似 = ガ ŀ ゥ 無 シ 本 ス = 色 力 テ居 種 乜 ŀ ŀ ŀ 單 子囊、 テ臺 ン ì ガ ァ 私 書 ŀ 房 n 7 其圖 灣產 ガ 科 ス イ 子囊胞子、 ア 臺灣 曾 n テ Ceratostomata-ラ記載 圖 7 ヲ n 虎斑竹 點 產 ヲ 描 ガ Þ 異 者 ィ Ŗ 分生 テ テ ッ ハ 內 成 テ